

## T a u s c h - C a t a l o g

## der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

\* schön oder selten; \*\* sehr schön oder sehr selten; N. Austr. = Australia septentrionalis.  
Die Preise in Reichsmark per Stück, zahlbar in Frankfurt a. M.

	Mk.			Mk.
*Pterocera scorpio, L., Moluck	3	*oculata, Lm.	Oc. ind.	1,50
Triton		subulata, L.	Pacif.	0,70-1
australe, Lm. Austral.	3,50	** " Prachtstück	"	3
Chemnitzii, Gray	Panama	**zebra, Kien.	"	3,50
chlorostoma, Lm. N. Austr.	1	Strutiolaria strutio, Ch. N.A.	3-4,50	
clandestinum, Lm. Philipp.	1,60	Buccinum		
oregonense, Redf. Alaska	2	acuminatum, Brod.	Nd. See	1-2,50
olearium, L. Societ. I.	1,20	*undatum v.sinistrorum, "c.o.	"	5
sinense, Rve. N. Austr.	0,60-1	Purpura		
tuberosum, Lm. Occ. ind.	0,30-60	echinulata Lm.	Oce. ind.	1
Ranella candidata, Lm. N.A.	1-1,50	coronata, Lm.	Oce. atlan.	1,20
" leucostoma, Rve. "	2-2,50	planospira, Lm.	Gallopagos	2,30
Fusus		Ricinula histrix, L.	Oce. ind.	1
colus, L. Oc. ind.	1-2	Seraphys terebellum Lm.		
crebriliratus, Rve. Austral.	2-3	6 varietates N. Austral.		0,50-60
laticostatus, Desh. Ceylon	4	Conus		
torenuma, Lm. "	2	nobilis, L.	Oce. ind.	3
turricula, Kien. China	1-2	sulcatus, Brug.	China	1,50
Fasciolaria distans, L.		*gubernator, Brug., maximus		
Campeche.	1	Oc. asiat.		3
Pyrula ficus? Lm. Austral.	1,50	*textile, L. maximus	"	3,50
" corona Gml. Mexico	3	?taeniatus, var. Hwss.	"	1-1,50
Turbinella gracilis? Austr.	2	Natica		
Ancillaria glabrata, L. Oc. ind.	1	conica, Lm.	Austral.	0,30-50
Eburna spirata, Lm. Ceylon.	0,80-1	glauea Humbold	Peru	0,50-70
Terebra		mamilla, L. maxima	Austr.	1
crenulata, L. Pacif.	1	maura, Brug.	"	0,80-1
** " Prachtstück	2,30	grönlandica, Beck.	Dog. Bk.	0,80-1
**dimidiata, L. Oc. ind.	3	plumbea, Lm.	Austral.	1,30
* " dunkel "	2	straminea, Recl.	In. or.	0,60
*duplicata & var. Oc. ind.	1	Naticina		
Terebra		papilla, Gray	N. Austr.	0,50-1,20
flammea? Lm. Oc. ind.	1-1,50	Lamarckiana, Recl.	"	0,50-1
*Hupei, Lorois Calif.	1-1,50	Scalaria Trevel., Lea	Nd. See	2
nebulosa, Sow. Oc. ind.	0,50-80			

	Mk.		Mk.
<i>Turbo</i>			
smaragdinus, Chm. Austr.	1,30	Alle verschieden. Sehr	
torquatus, Gmel.	1,50	interessant. Zusammen	20
petholatus & var. L. Oce. ind.	1,50	<i>Psammobia</i>	
<i>Trochus</i>		tellinella, Lm. Ins. norm.	0,50-80
maculatus, L. Philipp.	1,20	„ v. pura & purpurea „	1
pellis serpentis, Wd. Cent. Am.	1,20	costulata, Turt. „	0,80-1,20
labeo, L., Philipp.	1	<i>Thracia papyracea</i> Poli	
australis, Dsh. Oce. ind.	1	v. villosiuscula, Mc. Gill. „	1
Stomatia imbricata, L. „	0,60	Pecten pallium, L. v. regius Pac	9
Xenophora ? cerea, Rv. Phil.	1-3	Corbis fimbriat., L. Torres str.	3
„ ? sinensis, Phil. China	1-1,50	Venus plicata, Lm. Africa	1-1,50
Delphinula nodosa? Austr.	1,20	Cardium hians, Broc. Algeria	5-10
„ ? tyria, Rve.	2	Hemicardium medium, L.	
Cantharis iris, Chm.	2,50	grandis India occ.	1
Elenchus ? iriodon, Quoy	0,30	Hemicardium unedo, L. Ind. or.	0,50-1
„ ? pictus, Wood	0,70-1,20	Cardita incrassata, Sow. Aust.	2-2,50
<i>Turritella</i>		„ ? variegata, Brug. „	1,50
communis, L., Europa	0,20	Crassatella decipiens, Sow. „	7,50
terebra, Lm. Africa.	0,50-80	Atlanta Peronii, Lesu. M. Sulu	0,80
bicingulata, Lm.	0,40	„ Keraudrenii, Rang. „	0,60
duplicata, Lm. Ceylon	1,20	Pythia scarabœus, L. Bks. Ins.	0,50
fuscata, Lm. Senegal	0,50	Pfeifferia micans, Pfr. Phil.	2
tigrina, Kien. Chili	0,80	<i>Nanina</i>	
<i>Crucibulum</i>		ovum Val. Phil.	2-2,30
extinctorium, Sow. Oce. ind.	1,20	cambodgiensis, Rm. Ind. or.	5-6
? spinosum, Sow. Pacific	0,80	monticula, Hutt. Himalaya	0,50-80
<i>Haliotis</i>		bulla? Pfr. Phil.	1-1,30
asinina, L. Austral.	0,60	Ariophanta trifasciata, Chm.	
„ major.	1,20	Malabar.	2,50
„ mauritiana? Rb. Maurit.	0,40-70	<i>Cochlostyla</i>	
„ rubiginosa, Rve. Tonga I.	0,40-80	Najas, Pfr. Phil.	1,60
„ div. Austral. schön „	0,40-1	Aphrodite, N. Caledonien	1,80
Umbrella indica, Lm. Maurit.	1	metaformis, Sow. & v. Phil.	0,80-1
Chiton borbonicus, Rob.	0,50-80	pulcherrima, Sow. „	1,20-2
Buccinulus glaber, Rv. Philip.	0,40	chloracea (?amoena) Pfr. „	1
„ solidulus, L. Oce. ind.	0,60	tukanensis, Pf. Tukan besi	1
Cyllichna ? arachis, Quoy Aust.	0,80	zebuensis, Brod. Zebu	1,70
		siquijorensis, Brod. Siquijor	2,40

		Mk.			Mk.
albajensis, Sow.	Luzon	1,20			
Roissiana, Fér.	Philipp.	0,80	<i>Helix</i>		
mirabilis, Fér.	"	1	candisata, Friv.	Syra	0,60
luzonica, Sow.	"	1	cyrtolena, Bourg. & v. Arcadia		1
polychroa, Sow.	"	1	Falconari, Rve.	Austral.	9
iloconensis, Sow.	"	0,90	hellenica, Mouss.	Euböa	0,75
balteata, Sow.	"	1,20	latecava, " n. sp.	Santorin	1,20
citrina, Brg. links&rechts	"	0,90	stenostoma, Pfr.	Haiti	0,50
chloris, Rve.	Philipp.	0,90	Syrensis, Pfr.	Syra	0,50
sinistralis, Rve.	"	0,80	nemoralis, L. var. sinistrorsa		
Buschi, Pfr.	"	1,20		Hibern.	15
pithogaster, Fér.	"	1,50	Bulimus Fungairinoi, Hidal.		
mindorensis, Brod.	"	1,50		Ecuador	6
?trilineata	"	1,50			

*Rectification des dernières Clausiliæ:*

naevosa Roth, v. castrensis, Parr. vice castrensis . . . . .	0,35
" " v. coreyrensis, Mouss. vice corcyr. . . . .	0,40
byzantina, Charp., v. solidula Parr. vice: inflata Desh.	0,45
straminea, Parr. vice Moreleti, Blanc . . . . .	0,45
bicristata, Friv. var. vice oxystoma, Rossm. . . . .	0,30
" Fr. v. canaliculata, Pf. vice Euböica Rve. . . . .	0,30
negropontina, Desh. v. costulata, Thiesse, vice negropontina Dsh.	0,25
incommoda, Böttger, vice Schuchi Voith . . . . .	0,40
messenica, v. Mart. var. laconica, Mouss. vice laconica Mouss.	0,40
Kephissiae, Roth, vice tetragonostoma, Pf.	0,30
turrita, Parr. vice teres Oliv. . . . .	0,50
strigata, Parr. vice rythimensis, Blanc . . . . .	0,40

*N.B. Die Herren, welche von Obigen gehabt, werden gebeten, die Bestimmungen zu ergänzen.*

*Ferner neu erhalten:*

Anaphiensis, Böttg. . . . .	Ins. Anaphis	0,55
coerulea, Fér. v. birugosa, Parr. . . . .	Santorin	0,40
modesta, Zgl. v. intericta, Mouss. . . . .	Cephalonia	0,35
cinerea Fér. . . . .	Italia inf.	0,30
" v. candidescens, Zgl. . . . .	Napoli	0,45

**T. A. Verkrüzen,**  
**Oederweg 96. Frankfurt a. M.**